



Berdomenel
Vas 11 S 46

Berdomenel

Vass3R13s141-145




INRA Collection Vassal-Montpellier


461Mtp1

Handwritten: 11 S 46
Vass3R13s141-145
Berdomenel

Berdomenel
11 S 46

046101 Berdomenel 11 S 46
E.M.





Désignation : Berdomenel

Clos Planche 11 Côté S N° 46

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 24-9-56 +5

1-6

2-2

3-7

4-6

5-0

3^e époque

Pr: 2

Désignation : Berdomenel

Clos Planche 11 Côté S N° 46

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité : 16-9-57 +5

1-3

2-0

3-2

4-1

5-0

Pr: 3

pourrait être

3^e époque

M. let. 9.1958 B:0

(+3)

Désignation : Berdomenel

Clos Planche 11 Côté S N° 46

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 8

2 8

3 20

4 8

5 6

Année 1956

Berdomenel

N°

Planche

Côté 11.5.46 .

	Nombre total	D A T E S						
		20	22	26	28	30	3	
1	8	0	0	0	0	4	5	
2	8	0	0	0	3	3	4	
3	8	0	0	1	3	4	5	
4	8.4	0	0	0	2	3	3	
5	8	0	0	1	2	2	6	

30-3-56

↑
D
=

II

Année 1957

Berdomenel

N°

Planche

Côté 11.5.46 .

	Nombre total	D A T E S						
		14-3	16-3	20-3				
1	8	0	4	7				
2	8	4	5	6				
3	10	1	4	6				
4	8	0	1	3				
5	10	0	2	3				

IV^e

D le 20-3-57

Année 1958.

Berdoumenel -

N° Planche Côté 11.846

	Nombre total	D A T E S								
		19/3	22.3	27/3	31/3	2.4				
1	20.	1 1	3.	5.	9.	12 ^x
2	19.	1 2	2.	4.	7.	9.
3	24.	1 1	3.	7.	12.	16 ^x
4	21.	1 1	4.	6.	10.	12 ^x
5	23.	0 0	2.	6.	9.	15 ^x

T. Ponguez

D 61-4-58

III^e

Année 1959

Berdoumenel

N° Planche 11.846 Côté

	Nombre Total	D A T E S								
		11.3	14.3	18.3	21.3	25.3				
1	10	0.	0.	3.	3.	6.
2	10	3.	4.	6.	7.	8.
3	10	0.	1.	2.	3.	5.
4	8	0.	0.	2.	3.	7.
5	10	0.	0.	2.	2.	6.

D 6 24-3-59

CEE

ANNEE:

1938

HCN

Berdomenel B
0461-2.

EMPLACEMENT

3 R13 S144-145
A R29 W S16-20

Cote	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	6	26.3	31.3	7	6	24.5	28.5	2.6	20.7	24.7	28.7	24.8
2	4	23-3	31.3	1			+4			+1		+2
3	6	16.3	23-3	5		Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C						
4	6	19.3	31.3	1		Pour : Mill :						
5	6	23-3	31.3	4		Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
	28			18		Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré						
		D. le	23.3.38	(+16)		Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Port : Vigueur : ..						

Désignation : Berdormenel

VASSAL Planche 11 Côté 5 N° 46 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- ~~41~~ 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
~~42~~ 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~31~~ - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
~~43~~ 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
~~44~~ 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Berdomenel*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *46* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45
46
26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
27 - *à limbe plan* 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
47
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
48
30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
48
31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 32 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
49
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
49
33 - entièrement *8* - partiellement *9* .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

R.Sahuc 31.5.54

F

N° ordre

Désignation :

Berdornemel

VASSAL

Planche 44 côté S N° 46 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 50 ~~36~~ - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 51 ~~37~~ - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 52 ~~38~~ - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4 .
- 52 ~~38~~ - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 21-6-54

N° ordre

Désignation

Berdourenel

VASSAL planche XI côté S N° 46 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite ~~1~~ - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre ~~4~~ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
35 - limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe: plan ~~1~~ - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté ~~1~~ - tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
38 face inférieure: verte ~~1~~ - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3 .
39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Murour Août 54

N° ordre

Désignation *Berdoumenel* -

VASSAL planche 11 côté S N° 46 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 23-7-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *u* côté *S* N° *46* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- 25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification *3*.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

Phob.

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite ~~5~~ - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- de couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- 30 - à peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- 31 - à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Thouvenin 15-9-56

Dénomination *Berdomenel*

Planche *11* côté *5* Rang .. *46* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *1.5* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquet 372.56

V

N° d'ordre: . . 046101. Désignation: Berdomenel. . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 11546. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd. /B. ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rouquier

CEE

Formulaire de description 2/8
(floraison)

Année : 1998

Observateur : Lacombe

Code cépage : OH61

Code clone : e1

Nom cépage : Berdomenel B

Emplacement : 3 R13, S141-145
A. R29 W S16-20

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1 - en liseré 2 - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3
cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil : étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -
plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.(Dans le cas où la 1^{re} feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e feuille détachée sera
notée :idem.....)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -
très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -
plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233

Formulaire de description 3/8
(floraison)

Année : 1988

Observateur : Lacombe

Code cépage : 0461

Code clone : 01

Nom cépage : Berdomenel B

Emplacement 3 RBS 141. 145
A. Reg W 16-20

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé (1) - demi-érigé (3) - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge (3)

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges (2) - rouge 3

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge (3)

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges (2) - rouge 3

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence (1) - présence 9

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence (1) - présence 9

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible (1) - moyenne 5 - forte 9

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible (1) - moyenne 5 - forte 9

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne (5) - forte (7) - très forte 9

oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - moyenne (2) - forte ou très forte 3

oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins) (1) - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2

oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) (3) - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite (3) - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud (1) - au-delà du 4° noeud 2

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins (1) - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée (2)

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune (288 et 289) - épines ou analogues 243 - poils massifs 244

Couleur des vrilles : verte 260 - jaune 261 - rouge (262 et 263)

Formulaire de description 4/8
(entre nouaison et véraison)

Année : 1998

Observateur :

Code cépage : 0461

Code clone : 01

Nom cépage : Berdomenel B

Emplacement : 3 R13, 144-145
A. R29 W16.20

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.oiv 070 **pigmentation anthocyannique nervures face supérieure limbe** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4 *très rouge*oiv 071 **pigm. antho. nerv. face inf. limbe** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.oiv 072 **gaufre limbe** (entre nervures II et III) : absente 1 - présente 9.oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I et II) : absente 1 - présente 9.oiv 074 **profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.oiv 075 **cloque face supérieure limbe** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 087* **densité poils dressés face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal :

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.**Densité poils dressés limbe face supérieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.**Couleur du pétiole** : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176TN 3- 5

Formulaire de description 5/8
(maturité)

Année : 1998

Observateur :

Code cépage : ok61

Code clone : 01

Nom cépage : Berdomenel B

Emplacement : 3 R 13, 141-145
A - R 22 W 16-20

Grappe

oiv 202 **longueur** : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) ¹²3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.oiv 203 **largeur** : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) ¹²3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.oiv 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte ⁷7 - très compacte ⁹9.oiv 206 **longueur pèdoncule** : très court (<2cm) ¹1 - court (2-4cm) ³3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.oiv 207 **lignification du pèdoncule** : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié ⁷7oiv 208* **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale ²2oiv 209* **présence d'un aileron** : absent ¹1 - une aile ²2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) ¹⁶⁻¹⁷5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) ¹⁴⁻¹⁵3 - moyenne (14-20mm) ¹⁴⁻¹⁵5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme ³3oiv 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique ³3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune ¹1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme ²2oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible ³3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince ³3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.oiv 229 **ombilic** : peu apparent ¹1 - apparent 2.oiv 230* **coloration de la pulpe** : non colorée ¹1 - colorée 2.oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée ¹1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse ²2oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible ³3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.oiv 236 **saveur** : aucune ¹1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.oiv 236* **saveur** : aucune ¹1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.oiv 238 **longueur pèdicelle** : très court (<4mm) ¹1 - court (4-8mm) ³3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.oiv 240 **séparation du pèdicelle** : très facile 1 - facile 3 - moyen ⁵5 - difficile 7 - très difficile 9.oiv 241 **présence de pèpins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents ³3.oiv 242 **longueur pèpins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. ^{6 mm}oiv 243 **poids d'un pèpin** (moyenne de 100 pèpins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pèpins** : absentes ¹1 - présentes 2.Vassal : grappe : axe de la rafle : non coloré ⁸¹81 - coloré 80.

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année : 1998

Observateur :

Code cépage : 0461

Code clone : 01

Nom cépage : Berdomenel B

Emplacement : 3 R13 S141-145
A-R23 W116-20

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire (1) - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée (3).

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre (2) - rouge violacé 3 - gris (4).

oiv 104 **lenticelles** : absentes (1) - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence (1) - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence (1) - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) (3) - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) (5) - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens (2) - saillants 3.

Formulaire de description 7/8
(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

Année : 1998
Code cépage : 0461 Code clone : 01
Nom cépage : BERDOMENEL B
Emplacement : 3 R 13 2141.145 A. R 29 W 16.20
Observateurs : Laumbe Parra

Feuille d'herbier

oiv 076 forme des dents : côtés concaves 1 - côtés rectilignes 2 - mélange notation 2 et 4 : ③ - côtés convexes ④ - un côté concave, un côté convexe 5.

oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes 5 - grandes ⑦ - très grandes 9.

oiv 078 rapport longueur/largeur dents : très courtes 1 - courtes ③ - moyennes ⑤ - longues 7 - très longues 9.

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert ② - peu ouvert 3 - fermé 4 - lobes chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6.

oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U 1 - en accolade 2 - en V ③

oiv 0811 dents sur bord sinus pétiolaire : absence ① - présence assez fréquente 1 ou 2 dents 2.

oiv 0812 sinus pétiolaire dégarni : absence ① - présence fréquente sur un côté 2 - présence fréquente sur deux côtés 3.

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus 1 - ouvert ② - fermé 3 - lobes chevauchants 4.

oiv 0831 forme base sinus latéraux supérieurs : en U 1 - en accolade ② - en V 3.

oiv 0832 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absence ① - présence fréquente 2.

Mesures ampélométriques sur feuille d'herbier

oiv 601 longueur nervure N1 : très courte (<75mm) 1 - courte (105mm) 3 - moyenne (135mm) 5 - longue (165mm) 7 - très longue (>195mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 112

oiv 602 longueur nervure N2 : très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) 3 - moyenne (105mm) 5 - longue (125mm) 7 - très longue (>145mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 98

oiv 603 longueur nervure N3 : très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm) 5 - longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 72

oiv 604 longueur nervure N4 : très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 - longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 42

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (S1) : très courte (<3cm) 1 - courte (5cm) 3 - moyenne (7cm) 5 - longue (9cm) 7 - très longue (>11cm) 9. Valeur absolue (en mm) : 4,5

oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2) : très courte (<3cm) 1 - courte (4,5cm) 3 - moyenne (6cm) 5 - longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm) : 4,1

oiv 607 angle entre N1 et N2 mesuré à la 1^o bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) : 64

oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1^o bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) : 48

oiv 609 angle entre N3 et N4 : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) : 58

oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité N5 : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) : 49

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 16,2 mm

oiv 612 longueur de la dent N2 : très courte (<6mm) 1 - courte (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 8,3

Formulaire de description 7/8 (suite)
(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

oiv 613 **largeur de la dent N2** : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 12

oiv 614 **longueur de la dent N4** : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 6

oiv 615 **largeur de la dent N4** : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 9

oiv 616 **nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1^o nervure secondaire de N2** : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue : 6

oiv 617 **distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1^o nervure secondaire de N2** : très courte 1 - courte 3 - moyenne 5 - longue 7 - très longue 9. Valeur absolue (en mm) : 5,0

oiv 066.4* **longueur nervure N5** : très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 - longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 16

oiv 066.5* **distance entre point pétiolaire et départ N4** : très courte (<4mm) 1 - courte (8mm) 3 - moyenne (12mm) 5 - longue (16mm) 7 - très longue (>20mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 14

oiv 079.1* **ouverture/superposition du sinus pétiolaire** : très ouvert (<-35mm) 1 - ouvert (-15mm) 3 - fermé (-5mm) 5 - chevauchant (+25mm) 7 - très chevauchant (>+45mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 1

Vassal :

Angle du lobe terminal : faible (<90°) 45 - moyen (=90°) 46 - grand (>90°) 47.

Formulaire de description 8bis/8
(maturité)

Année : 1998

Observateur : D. Ionsel

Code cépage :

Code clone :

Nom cépage :

Emplacement :

Récolte

oiv 502 **poids d'une grappe** : très faible (<100g) 1 - faible (200g) 3 - moyen (400g) 5 - élevé (800g) 7 - très élevé (>1200g) 9. Valeur absolue (en g) :

oiv 503 **poids d'une baie** : très faible (1g) 1 - faible (2g) 3 - moyen (4g) 5 - élevé (8g) 7 - très élevé (>12g) 9. Valeur absolue (en g) :

oiv 504 **rendement en kg/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. Valeur absolue :

oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 505 **teneur en sucre du moût** : très faible (<13%) 1 - faible (15%) 3 - moyen (18%) 5 - élevé (21%) 7 - très élevé (>24%) 9. Valeur absolue (en %) :

oiv 506 **acidité totale du moût** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. Valeur absolue (en g H₂SO₄/l) :

oiv 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Vassal :

	NOM : Berdemeneel	EMPLACEMENT : 3 R 130 141-145
Vendange	Date : 2 / 09 / 98 Nombre de souches récoltées : 4 Poids total de la vendange : 1,500 Kg Nombre total de grappes : 7 Rendement à l'hectare : 6,750 T = (poids total / nbr souches) x 4500 Pourriture (%) : 0 Couleur épiderme : vert jaune Saveur : sans	Poids d'une grappe (oiv 502) : 214 g Poids d'une baie (oiv 503) : 2,12 g
Pressurage	Rendement en jus (ml / 100 g baies) (oiv 233) : 50 Indice réfractométrique (oiv 505) : 20,6 Acidité moût (g H ₂ SO ₄ /l) (oiv 506) : 7 pH du moût : 3,35	
Pépins	Poids de 100 pépins secs (g) : 2,60 longueur des pépins (mm) (oiv 242) : 6,9	Poids d'un pépin (oiv 243) : 0,026 % pépins creux : 12